

PROTOCOLE DOULEUR SAU

Principales CI des antalgiques :

Paracétamol (Dolitabs®, Doliprane®, Perfalgan®)

- Hypersensibilité au paracétamol ou chlorhydrate de propacétamol (pour Perfalgan®)
- Insuffisance hépatocellulaire sévère

AINS IV (Profenid®)

- Grossesse au delà de 24 SA
- Hypersensibilité au Kétoprofène ou l'un des excipients
- ATCD d'asthme déclenché par la prise d'AINS ou Aspirine
- Hémorragie gastro-intestinale
- Hémorragie cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en évolution
- ATCD d'hémorragie ou perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS
- Ulcère intestinal en évolution, ATCD d'ulcère peptique ou d'hémorragie récurrente
- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance rénale sévère
- Insuffisance cardiaque sévère
- Hypovolémie sévère

Efferalgan codéiné®

- Enfant de moins de 15 ans

Liées au paracétamol :

- Hypersensibilité au paracétamol ou aux autres constituants
- Insuffisance hépatocellulaire

Liées à la codéine :

- Insuffisance respiratoire (quelque soit le degré)
- Asthme

- Hypersensibilité à la codéine
- Allaitement

Liées à la présence d'Aspartam:

- Phénylcétonurie

Morphine® IV

- Allaitement
- Epilepsie non contrôlée
- Hypersensibilité à l'un des composants ou aux morphiniques
- HTIC
- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance respiratoire sévère
- TC grave