



## Stratégie d'utilisation des PCR Covid + grippe sur IDnow aux urgences Indications de dépistage séquentiel

Patient présentant des **Signes et symptômes suggestifs d'une infection respiratoire aiguë** :

= survenue récente d'au moins un signe général **et** d'au moins un signe fonctionnel ou physique d'atteinte respiratoire basse ou d'une infection respiratoire biologiquement confirmée.

- **Signes généraux** : fièvre, frissons, sueurs, céphalées, myalgies, arthralgies, fatigue
- **Signes respiratoires** : mal de gorge, rhinorrhée (rhume), toux, sifflement, dyspnée (essoufflement), douleurs thoraciques, signes auscultatoires récents diffus ou en foyer.

**Merci de bien faire apparaître le résultat de la PCR dans l'onglet spécifique sur le TU**  
**Les résultats de PCR remontent instantanément et peuvent être consultés sur cyberLab**



*Pour rappel*

### Mesures de prévention

Dans la mesure du possible, devant des symptômes invalidants impactant les activités quotidiennes ou professionnelles, il est conseillé au patient de **rester à domicile** pendant la période de contagiosité :

En cas de grippe : pendant 5 jours avec 48h sans fièvre selon le contexte ;

En cas de Covid-19 : pendant 7 jours avec 48h sans fièvre selon le contexte.

**Indication du Paxlovid ( nirmatrelvir/ritonavir)**: Adultes ne nécessitant **pas d'oxygénothérapie** et ayant un **risque élevé d'évolution vers une forme grave** de la Covid-19, à administrer précocement **dans les 5 jours** suivant l'apparition des symptômes et pendant 5 jours. (Hors Contre-indication++)

**RAPPEL**