

# AEV : Accident d'Exposition au risque Viral

## PATIENT SOURCE

### Un liquide biologique potentiellement à risque

- Sang
- LCR
- Sécrétions inflammatoires
- Sperme, sécrétions vaginales/anales

NB : Non à risque : Les urines (sauf si hématurie), Les selles (sauf si rectorragie), Larmes, sueur, salive

**AEV  
VIH,  
Hépatites**

## PERSONNE CIBLE

### Type de contact potentiellement à risque

- **Un contact transcutané (avec saignement chez la cible):** Piqure, Coupure (bistouri...), Griffure, Plaie saignante, morsure
- **Un contact cutané muqueux prolongé :** Peau lésée, Muqueuses , Œil
- **Un contact sexuel :** sperme, sécrétions sexuelles (rapport vaginal, anal, oral)

## PRELEVER LE PATIENT SOURCE

Après accord

Faire TROD pour aide à la décision de TTT

TUBES

**2 tubes jaunes**

Si Patient source connu comme VIH+ ou VHB+ ou VHC+, envoyer une charge virale :

**2 tubes nacrés en plus**

VIRO

Bon: étiquette de la source + **cocher la case AEV source**

Appeler le laboratoire qui va réceptionner les tubes : nom source, N° téléphone pour rendu résultats, nom cible

TRANSPORT

**Jours et heures ouvrables** (arrivée des tubes entre 9h et 17h la semaine, avant 11 h le samedi): **Laboratoire de Virologie L'archet 2** : ☎ 36184 ou 36301, Fax 39219

**Nuit WE et fériés : Interne de garde de biologie**

PTA Pasteur(☎38163 ou 37843 ou bip 70-3305- n° de poste ) tri Pasteur1: 38290 (technicien 37843) collecte : 39860 ou 38247

## DESINFECTER

- plaie cutanée : **Laver** au savon doux puis **rincer** puis **Dakin® pendant 5 minutes** (ou à défaut, tout autre antiseptique)
- En cas de projection muqueuse ou oculaire : Si lentilles de contact les enlever immédiatement puis **rincer abondamment au sérum physiologique pendant 5 minutes** ou à l'eau courante. Ne pas mettre d'antiseptique dans les yeux.

## CONSULTER REFERENT AEV idéalement dans les 4 h (tjs<48h)

**Jours et heures ouvrables (8h 18h) : Virologie Clinique consultations. L'archet 1 6<sup>ème</sup> étage☎ : 35 467**

**Nuit We et fériés : Urgences Pasteur 2 ☎ 3 33 75 / 3 33 63**

**URGENT**

# AEV : Accident d'Exposition au risque Viral

**URGENT**

**PATIENT SOURCE**

**INFORMER LE  
PATIENT  
SOURCE  
DE SES  
SEROLOGIES**

ET LE PRENDRE EN CHARGE POUR  
LA SUITE DE CE SUIVI SI

**SEMI-URGENT  
<48h/72h**

## TRAITEMENTS PREVENTIFS (si nécessaires)

### PERSONNE CIBLE

**Trithérapie préventive: EVIPLERA\* 1 comprimé par jour (en mangeant)** 

**Ordonnances pré imprimées** mallette AEV : **Préparer l'Eviplera** à remettre à la personne cible (cf documents explicatifs mallette)

**Le traitement remis à la cible doit être suffisant pour aller jusqu'au jour ouvrable où la cible pourra consulter en Infectiologie auprès du référent AEV** (par exemple si consultation samedi AM, donner le traitement nécessaire pour aller jusqu'au Lundi matin inclus). Veiller à couvrir les jours fériés.

**Si contre indication ou difficulté particulière** (grossesse, CI néphro ou hépatique, interaction grave possible, source connue comme VIH+ et traitée...), contacter le référent de garde d'Infectiologie 04 92 03 96 88

**Autres traitements préventifs** : VHB : Ig VHB (non immunisé). Contraception orale d'urgence, ttt MST si AEV sexuel , Préservatif

### SUIVI PERSONNE CIBLE

**: Le patient cible doit se présenter sans RDV en Infectiologie le 1<sup>er</sup> jour ouvrable après AEV.** : Virologie Clinique consultations. L'archet 1 6<sup>ème</sup> étage ☎ : 04 92 03 54 67. (8h 18h)  
BILAN INITIAL CIBLE (VIH, Hépatite B et C, MST si AEV sexuel ...)  
But : Réévaluation du traitement VIH et mise en place du suivi

**DECLARATION ACCIDENT TRAVAIL (AEV pro) et suivi en Médecine du travail (AEV non traité)**