Information Patient

Traitement post exposition au VIH

Le traitement post exposition (TPE) consiste à prendre un traitement antirétroviral en urgence après un accident d'exposition viral (un rapport sexuel non-protégé, par exemple), dans le but de prévenir la transmission du VIH.
Le traitement doit être pris le plus vite possible, dans les 4 h, au plus tard 48h et dure 1 mois.

Vous allez débuter un traitement post exposition par DELSTRIGO® à raison de :
1 comprimé par jour à heure fixe
Vous disposez de 5 comprimés, le premier est à prendre le plus rapidement possible (avec ou sans repas).

Ce kit d'urgence vous permet d'attendre votre consultation dans un centre expert. **Cette consultation devra être faite dans les 5 prochains jours**. En fonction de l'évaluation du risque, le médecin confirmera la nécessité de poursuivre ce traitement pendant 1 mois.

Les centres experts sont :

Centre Gratuit d'informations, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
8 avenue Baquis
06000 Nice
(Tram L1 : arrêt Jean Médecin)

04 89 04 55 60
cegidd06@departement06.fr

Pour vous rendre au CeGIDD, scannez le QRCode

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital Archet 1
151 Route de Saint-Antoine de Ginestière
06200 Nice
(Bus 10 : arrêt Hôpital Archet)

04 92 03 54 67
infectiologie@chu-nice.fr

Pour vous rendre à l'hôpital Archet, scannez le QRCode

Si vous avez des problèmes rénaux ou si vous avez déjà fait une allergie à un traitement, signalez-le à l'équipe des urgences. Ce traitement provoque parfois des troubles digestifs de faible intensité et transitoires.

Un membre de l'équipe du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales vous contactera pour organiser la suite de votre prise en charge.

Si vous pensez avoir un risque d'être enceinte, vous pouvez vous diriger vers une pharmacie dans les 72h pour vous procurer une contraception d'urgence gratuite (pilule du lendemain).
Pensez à réévaluer votre contraception avec votre sage-femme, votre médecin généraliste ou votre gynécologue.