Dr Colin VESES
Veses.c@chu-nice.fr

Unité de Traitement
par Oxygène Hyperbare

(UTOH)

Hôpital Pasteur

04/07/2025

Unité de Traitement par Oxygène Hyperbare

UTOH

Oxygénothérapie Hyperbare (OHB)

et ses indications en **urgence**

Indications de l'OHB en Urgence

Recommandation de type 1 :

transfert vers un centre hyperbare **fortement recommandé** car l'OHB peut changer le pronostic vital.

- Accident de plongée
- Embolie gazeuse
- Gangrènes des tissus mous
- Intoxication au CO

Unité de Traitement par Oxygène Hyperbare

- UTOH -

Equipe soignante

5 Médecins (2,8 ETP)

+ Chef de service Dr A. KAUERT

5 IDE

5 (6) Techniciens

1 Cadre technique (P. BAREL)

3 ASH

3 AMA

7/7, 24h/24, 365j/an

Numéro Unique

37772

OHB

Administration
d'Oxygène
à une
pression
supérieure à la
pression
atmosphérique

Pour faire de l'Oxygénothérapie Hyperbare (OHB)

Basics...

Vous aurez besoin ...

d'un **caisson**

= enceinte
hermétique

de **pression**

Air
>1ATM

d'O₂*

100%

** ou autre gaz
thérapeutique*

... et d'un personnel formé à l'hyperbarie

Chambre métallique conçue pour résister à la pression

- **Multi-places**
(1 ou plusieurs chambres)

Chambre métallique conçue pour résister à la pression

- **Multi-places**
(1 ou plusieurs chambres)

Chambre métallique conçue pour résister à la pression

- **Bi-place** de transport
(militaire)

1 Le caisson hyperbare

Chambre métallique conçue pour résister à la pression

- **Mono-place** à oxygène
(stop en France)

Répartition des centres hyperbares

La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Papeete.

14 centres en France
métropolitaine
+ 5 en DOM-TOM

(2 centres militaires; Toulon & Brest)

*+/- bien répartis
sur le territoire*

Concentration
méditerranéenne
historique

Mise en pression
de la chambre
à l'**AIR** comprimé

Air comprimé fourni par
des **compresseurs**

ATA

Oxygène pur ou mélanges suroxygénés

Gaz thérapeutique délivré au patient
à l'aide d'un **masque**

Le plus étanche possible
→ Fuites = pollution
= Risque incendie

Dans la chambre : pollution en **O₂** Max 23%

NITROX

heliox

Gestion des risques

> 80% des séances sont accompagnées (IDE, techniciens, rarement médecins)

Barotraumatique

Pression / volume

- Tympanique ++
- Sinusal
- Dentaire
- Pulmonaire

Comitial

Toxicité neurologique de l'O2

Crise convulsive hyperoxique

Incendie

PpO2
Réaction exothermique au contact du gras

Absolues

Très rares
en pratique

Relatives

Discussion
balance B/R
au cas par cas

Pneumothorax non drainé

Deux référentiels

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

- Consensus d'expert sur les indications de l'oxygénothérapie hyperbare HAS (2007)

- 10^{ème} conférence de consensus européenne de Médecine Hyperbare (Lille 2016)

Prochaine conférence de consensus européenne
→ 2026 (Gdansk)

HAS 2007

11 indications

03/04/2025

Pathologies	Pression	Durée de la séance	Nombre habituel de séances	Espacement des séances	Mesures de la P _{TCO₂} sous OHB	Population-cible (nombre de patients/an)*
Intoxication au CO	2,5 ATA	90 min	1 séance (au grand maximum 5)	NR [†]	Non	2000-2500
Accident de décompression : traitement initial	2,8 à 4 ATA	Jusqu'à 7 h		/	Non	380
Accident de décompression : traitement des déficits résiduels	2,5 ATA	90min	Jusqu'à 10, voire plus si récupération objective	2 séances/j	Non	Non disponible
Embolie gazeuse	4 à 6 ATA	Jusqu'à 7 h	1 ou plus	Dépend de l'évolution clinique	Non	90
Infection bactérienne à germes anaérobies ou mixtes, nécrosante des tissus mous	2,5 ATA	90 min	2 à 3 séances dans les 24 h, puis 10 séances	Dépend de l'évolution clinique	Non	250
Abcès intracrânien, pleuro-pulmonaire, hépatique	2,5 ATA	90 min	10	Dépend de l'évolution clinique	Non	30
Écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C)	2,5 ATA	90 min	> 10	Dépend de l'évolution clinique	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TCO₂} > 20 mmHg	400-500
Lésions radio-induites : ostéoradionécrose de la mandibule et cystite radio-induite	2,5 ATA	90 min	20-60	Dépend de l'évolution clinique	Non	300-400
Pied diabétique	2,5 ATA	90 min	20-40 sur 3 à 4 semaines	1 à 2 séances/j	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TCO₂} > 10 0 mmHg	400
Plaie chronique ischémique non diabétique	2,5 ATA	90 min	10 séances/semaine	2 séances/j	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TCO₂} > 50 mmHg	150-300
Surdité brusque	2,5 ATA	90 min	10	Dépend de l'évolution clinique	Non	150-300

CONDITION	Accepté			Niveau d'agrément
	Niveau de preuve			
	A	B	C	
Type I				
Intoxication au CO	X			Agrément fort
Fracture ouverte avec délabrement	X			Agrément fort
Prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire	X			Agrément fort
Ostéoradionécrose (mandible)	X			Agrément fort
Radionécrose des tissus mous (cystite, proctite)	X			Agrément fort
Surdité brusque	X			Agrément fort
Accident de décompression		X		Agrément fort
Embolie gazeuse		X		Agrément fort
Infections bactériennes à anaérobies ou mixtes		X		Agrément fort
Type II				Agrément fort
Lésions de pied diabétique	X			Agrément fort
Nécrose de tête fémorale	X			Agrément fort
Grefe de peau et/ou lambeaux compromis		X		Agrément fort
Occlusion de l'artère centrale de la rétine		X		Agrément fort
Syndrome d'écrasement sans fracture		X		Agrément
Ostéoradionécrose (os autres que mandibule)		X		Agrément
Lésions radio-induites des tissus mous (autres que cystite et proctite)		X		Agrément
Chirurgie et implants en tissus irradiés (traitement préventif)		X		Agrément
Ulcères ichémiques	X			Agrément
Ostéomyélite chronique réfractaire	X			Agrément
Brûlures du 2 ^{ème} degré > 20 %	X			Agrément
Pneumatose intestinale	X			Agrément
Neuroblastome de stade IV	X			Agrément
Type III				Agrément
Cérebro-lésés (traumatisme crânien aiguë et chronique, AVC chronique, encéphalopathie post-anoxique) chez des patients hautement sélectionnés		X		Agrément
Lésions radio-induites du larynx		X		Agrément
Lésions radio-induites du SNC		X		Agrément
Syndrome d'ischémie-reperfusion après revascularisation		X		Agrément
Réimplantation de membre		X		Agrément
Plaies chroniques sélectionnées secondaires à un processus systémique		X		Agrément
Drépanocytose		X		Agrément
Cystite interstitielle		X		Agrément

Conférence de Consensus (Lille 2016)

30 indications

Recommandation de type 1 : transfert vers un CH (centre hyperbare) **fortement recommandé** car l'OHB peut changer le pronostic vital.

Recommandation de type 2 : transfert vers un CH **recommandé** car l'OHB constitue une part importante du TRT qui, s'il ne change pas le pronostic vital, peut prévenir des désordres sérieux.

Recommandation de type 3 : transfert vers un CH **facultatif** car l'OHB est considéré comme un TRT d'appoint.

Caisson
= machine à cicatriser

UTOH

Cœur de l'activité
de l'UTOH

**Aide à la
cicatrisation**

>50% de l'Activité

Notre pain quotidien

- Ulcères chroniques des MI
- AOMI
- Pieds diabétiques
- Cystites & Rectites radiques
- Chirurgie en terrain irradiés
- Lambeau en souffrance (sein, ORL ++)
- Fractures complexes, fracas & crush syndromes
- Amputation / ré-implantations
- ...

Aide à la cicatrisation

>50% de l'Activité

~25%
d'activité non
programmée
(file active de patients)

+/- Régulation 15 / SMUR / SAU

HAS 2007

Pathologies	Pression	Durée de la séance	Nombre habituel de séances	Espacement des séances	Mesures de la P _{TcO₂} sous OHB	Population-cible (nombre de patients/an)*
Intoxication au CO	2,5 ATA	90 min	1 séance (au grand maximum 5)	NR [†]	Non	2000-2500
Accident de décompression : traitement initial	2,8 à 4 ATA	Jusqu'à 7 h		/	Non	380
Accident de décompression : traitement des déficits résiduels	2,5 ATA	90min	Jusqu'à 10, voire plus si récupération objective	2 séances/j	Non	Non disponible
Embolie gazeuse	4 à 6 ATA	Jusqu'à 7 h	1 ou plus	Dépend de l'évolution clinique	Non	90
Infection bactérienne à germes anaérobies ou mixtes, nécrosante des tissus mous	2,5 ATA	90 min	2 à 3 séances dans les 24 h, puis 10 séances	Dépend de l'évolution clinique	Non	250
Abcès intracrânien, pleuro-pulmonaire, hépatique	2,5 ATA	90 min	10	Dépend de l'évolution clinique	Non	30
Écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C)	2,5 ATA	90 min	> 10	Dépend de l'évolution clinique	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TcO₂} > 20 mmHg	400-500
Lésions radio-induites : ostéoradionécrose de la mandibule et cystite radio-induite	2,5 ATA	90 min	20-60	Dépend de l'évolution clinique	Non	300-400
Pied diabétique	2,5 ATA	90 min	20-40 sur 3 à 4 semaines	1 à 2 séances/j	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TcO₂} > 10 0 mmHg	400
Plaie chronique ischémique non diabétique	2,5 ATA	90 min	10 séances/semaine	2 séances/j	Oui, mise en route de l'OHB si P _{TcO₂} > 50 mmHg	150-300
Surdité brusque	2,5 ATA	90 min	10	Dépend de l'évolution clinique	Non	150-300

CONDITION	Accepté			Niveau d'agrément
	Niveau de preuve			
	A	B	C	
Type I				
Intoxication au CO		X		Agrément fort
Fracture ouverte avec délabrement		X		Agrément fort
Prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire		X		Agrément fort
Ostéoradionécrose (mandible)		X		Agrément fort
Radionécrose des tissus mous (cystite, proctite)		X		Agrément fort
Surdité brusque		X		Agrément fort
Accident de décompression			X	Agrément fort
Embolie gazeuse			X	Agrément fort
Infections bactériennes à anaérobies ou mixtes			X	Agrément fort
Type II				Agrément fort
Lésions de pied diabétique		X		Agrément fort
Nécrose de tête fémorale		X		Agrément fort
Greffe de peau et/ou lambeaux compromis			X	Agrément fort
Occlusion de l'artère centrale de la rétine			X	Agrément fort
Syndrome d'écrasement sans fracture			X	Agrément
Ostéoradionécrose (os autres que mandibule)			X	Agrément
Lésions radio-induites des tissus mous (autres que cystite et proctite)			X	Agrément
Chirurgie et implants en tissus irradiés (traitement préventif)		X		Agrément
Ulcères ichémiques		X		Agrément
Ostéomyélite chronique réfractaire		X		Agrément
Brûlures du 2 ^{ème} degré > 20 %		X		Agrément
Pneumatose intestinale		X		Agrément
Neuroblastome de stade IV		X		Agrément
Type III				Agrément
Cérebro-lésés (traumatisme crânien aiguë et chronique, AVC chronique, encéphalopathie post-anoxique) chez des patients hautement sélectionnés		X		Agrément
Lésions radio-induites du larynx			X	Agrément
Lésions radio-induites du SNC			X	Agrément
Syndrome d'ischémie-reperfusion après revascularisation			X	Agrément
Réimplantation de membre		X		Agrément
Plaies chroniques sélectionnées secondaires à un processus systémique			X	Agrément
Drépanocytose		X		Agrément
Cystite interstitielle			X	Agrément

Conférence de Consensus (Lille 2016)

Des urgences « absolues » :

- Intoxication au CO
- Accident de désaturation
- Embolie gazeuse
- OACR
- Pendaison (incomplète)

Reco type I

= Appel UTOH
37772

CONDITION	Accepté			Niveau d'agrément
	Niveau de preuve			
	A	B	C	
Type I				
Intoxication au CO		X		Agrément fort
Fracture ouverte avec délabrement		X		Agrément fort
Prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire		X		Agrément fort
Ostéoradionécrose (mandible)		X		Agrément fort
Radionécrose des tissus mous (cystite, proctite)		X		Agrément fort
Surdité brusque		X		Agrément fort
Accident de décompression			X	Agrément fort
Embolie gazeuse			X	Agrément fort
Infections bactériennes à anaérobies ou mixtes			X	Agrément fort
Type II				Agrément fort
Lésions de pied diabétique		X		Agrément fort
Nécrose de tête fémorale		X		Agrément fort
Greffe de peau et/ou lambeaux compromis			X	Agrément fort
Occlusion de l'artère centrale de la rétine			X	Agrément fort
Syndrome d'écrasement sans fracture			X	Agrément
Ostéoradionécrose (os autres que mandibule)			X	Agrément
Lésions radio-induites des tissus mous (autres que cystite et proctite)			X	Agrément
Chirurgie et implants en tissus irradiés (traitement préventif)		X		Agrément
Ulcères ichémiques		X		Agrément
Ostéomyélite chronique réfractaire		X		Agrément
Brûlures du 2 ^{ème} degré > 20 %		X		Agrément
Pneumatose intestinale		X		Agrément
Neuroblastome de stade IV		X		Agrément
Type III				Agrément
Cérebro-lésés (traumatisme crânien aiguë et chronique, AVC chronique, encéphalopathie post-anoxique) chez des patients hautement sélectionnés			X	Agrément
Lésions radio-induites du larynx			X	Agrément
Lésions radio-induites du SNC			X	Agrément
Syndrome d'ischémie-reperfusion après revascularisation			X	Agrément
Réimplantation de membre			X	Agrément
Plaies chroniques sélectionnées secondaires à un processus systémique			X	Agrément
Drépanocytose			X	Agrément
Cystite interstitielle			X	Agrément

Conférence de Consensus (Lille 2016)

Des urgences « relatives » :

- Fracture ouverte délabrante
- Surdité brusque
- Gangrène gazeuse
- Fasciite nécrosante
- Greffe/lambeau en souffrance
- Ecrasement sans fracture
- (Brûlures 2^{ème} degré >20%)
- Ischémie/reperfusion
- Réimplantation de membre
- Crise vaso-occlusive drépanocytaire

Reco type I

Intoxication au Monoxyde de Carbone

CO

Qui envoyer au caisson ?

~ 250/an en PACA

= Appel **UTOH**
37772

Régulation coordonnée

15 **UTOH**

PEC pré-hospitalière :

- O₂ 15L/min MHC
- +/- Vit B12 (5mg)

RAD57 : variabilité mesures ++

HbCO : mauvais marqueur de gravité
(ne reflète pas l'intoxication tissulaire)

→ Taux normal ≠ pas d'intoxication

Intoxication au CO = OHB

Indication formelle d'Oxygénothérapie Hyperbare (OHB) :

- HbCO > 25% (initiale...)
- Signes de gravité clinique
(troubles de conscience, pdc ...)
- Femme enceinte

2.5 ATA 90min

En cas d'absence de caisson dispo, quelle alternative à l'OHB ?

→ Oxygénothérapie normobare (ONB) 12h ...

Quelle alternative ?

Intox au **CO**

Stade 0 : pas de symptôme

Stade 1 : inconfort, fatigue, céphalées

Stade 2 : signes généraux aigus (nausées, vomissement, vertige, malaise, asthénie intense) à l'exclusion des signes neurologiques ou cardiologiques.

Stade 3 : perte de connaissance transitoire spontanément réversible ou signes neurologiques ou cardiologiques n'entrant pas dans les critères de gravité du stade 4.

Stade 4 : signes neurologiques (convulsion ou coma) ou cardiovasculaires graves (arythmie ventriculaire, œdème pulmonaire, infarctus du myocarde ou angor, choc, acidose sévère).

HbCO > 25 %
Femmes enceintes

Indication formelle **OHB**

Fiabilité des mesures paracliniques in situ ?

Données du saturomètre faussées par l'HbCO

→ Non fiables (++) si co-intoxication cyanure)

Touger et al 2010 : Comparaison RAD-57 Vs HbCO

Authors	Year	Setting	# of Subjects	Limits of agreement for SpCO vs. COHb (%)
Coulange	2005	ED	12	-6.4 to +3.4
Mottram et al	2005	RT department	31	-1.5 to +5.5
Barker et al	2006	Laboratory	10	-5.5 to +3.1
Suner et al	2008	ED	64	-2.8 to +5.6
Kot et al	2008	Hyperbaric center	49	-7.9 to +8.9
Piatkowski et al	2009	Burn center	20	-1.5 to +7.8
Touger et al	2010	ED	120	-11.6 to +14.4
Roth et al	<i>Pending publication</i>	<i>ED</i>	<i>1,578</i>	<i>-3.4 to +9.4</i>

RAD-57

Imprécision : +/- 10% de variabilité

Problématique : faux négatifs

Touger M et al. Performance of the RAD-57 pulse CO-oximeter compared with standard laboratory carboxyhemoglobin measurement. Ann Emerg Med. 2010 Oct;56(4):382-8.

Fiabilité des mesures du RAD-57 ?

Papin et al. 2023 : Méta-Analyse RAD-57 & Triage des patients

21 études analysées

2089 patients, 3381 mesures

- Sensibilité 77% (CI, 0.66–0.85)
- Spécificité 86 % (CI, 0.74–0.89)

Conclusions :

They should probably not be used to confirm (rule-in) or exclude (rule-out) CO poisoning with certainty.

« the noninvasive measurement of COHb is clearly less accurate than advertised by the manufacturers. »

There were even negative SpCO levels (0%) while COHb was very high (>35%)

Papin et al. Accuracy of pulse CO-oximetry to evaluate blood carboxyhemoglobin level: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. Eur J Emerg Med. 2023 Aug 1;30(4):233-243.

Conséquences de la réoxygénation

Dissociation des complexes CO-Hémoprotéines :

- Selon la loi d'action de masse
- (retour à l'équilibre du rapport Produit/réactifs)

Les vitesses de dissociation ne dépendent que de l'abondance relative d'O₂, de CO, de protéines et de leurs affinités relatives.

Dissociation CO-Hb :

- Débute dès la soustraction à la source de CO
- Loi exponentielle avec T $\frac{1}{2}$ de **230 à 320 min en air**

Dissociation des autres complexes CO-Hémoprotéines :

- Beaucoup plus lente

Possible persistance de la symptomatologie malgré une HbCO normalisée.

Bases physiologiques du recours à l'OHB

- Dissociation des complexes CO-hémoprotéines.

→ spontanée mais lente ($T \frac{1}{2}$ HbCO ~ **230-320 min en air**)

Objectif = accélérer la vitesse de dissociation CO-Hémoprotéines

ONB

OUI : accélère la vitesse de dissociation

→ ($T \frac{1}{2}$ HbCO ~ **91 min sous ONB**; 44min pour les enfants *)

Mais : retard de détoxification tissulaire (complexes CO-hémoprotéines)
nécessite une délivrance tissulaire en O₂ satisfaisante
n'intervenant que tardivement une fois l'HbCO largement dissociée

* Klasner AE, Smith SR, Thompson MW, Pharm BS, Scalzo AJ. Carbon monoxide mass exposure in a pediatric population. Academic Emergency Medicine. 1998;5:992-996

Bases physiologiques du recours à l'OHB

- Dissociation des complexes CO-hémoprotéines.

→ spontanée mais lente ($T \frac{1}{2}$ HbCO ~ **230-320 min en air**)

Objectif = accélérer la vitesse de dissociation CO-Hémoprotéines

OHB

OUI : vitesse de dissociation accrue

→ ($T \frac{1}{2}$ HbCO ~ **35min à 2ATA** et **22min à 3ATA**)

ET : Restauration de la délivrance tissulaire en O₂ par la fraction dissoute

→ Loi de HENRY

Bases physiologiques du recours à l'OHB

Objectif = accélérer la vitesse de dissociation CO-Hémoprotéines

ONB

↑ vitesse de dissociation HbCO ~ T ½ 91 min
Pas d'action immédiate sur la détoxification tissulaire

OHB

↑ ↑ ↑ vitesse de dissociation HbCO ~ T ½ 25min
Restitution immédiate d'une délivrance périphérique en O2 normale

- Levée de l'hypoxie d'origine hypoxémique
- Début immédiat de la dissociation des complexes CO-hémoprotéines
- Reprise de l'activité du cytochrome A3
- ↓ production de radicaux libres oxygénés (ROS)

Occlusion de l'Artère Centrale de la Rétine

OACR

Occlusion de l'Artère Centrale de la Rétine **OACR**

***Take home
message***

AVC de l'oeil

Souffrance rétinienne
immédiate

Intolérance à l'ischémie
(nécrose rétinienne)

Time is retina

OHB en Urgence

Artère centrale de la rétine (ACR)

Occlusion de l'artère centrale de la rétine (OACR)

→ Ischémie rétinienne

Thrombo-embolique ++

Ischémie rétinienne

Origine

artère Ophtalmique,
branche de la **Carotide Interne**

Trajet

pénètre le globe oculaire
au sein du **nerf optique**

Vascularisation

couches internes de la **rétine**

OACR

OACR : Présentation clinique

Ischémie rétinienne aiguë

**BAV unilatérale
œil blanc & indolore**

- **Souffrance hypoxique**
- **Perte de vision brutale**
- **irréversible en l'absence de PEC**
- **+/- nécrose rétinienne (<90min)**

Rare : 2%⁰⁰⁰ (10%⁰⁰⁰ après 80ans)

85% de cécité à 3 mois

15% d'amélioration spontanée

Reperfusion spontanée

(<21j +++)

OACR – Évolution naturelle

Catastrophique...

Reperfusion spontanée ++
→ 25% première semaine
→ dans les 21j

Régression oedème rétinien
→ en 4-6 semaines

Mais...

Séquelles visuelles ++
→ Perception lumineuse
→ Voit bouger la main

AV < 1/20^{ème} dans 80 %

Glaucomes néovasculaires (2,5%)
→ ischémie chronique
→ OACR non reperfusés ++

Si non reperfusion J21
→ Stop OHB
→ Pan-photocoagulation

Méta-analyse : 396 OACR (8 études) :
→ **17.7% d'amélioration spontanée**

Thérapeutiques « historiques »

Inefficaces

- Fragmentation des embolies
 - massages oculaires, laser YAG
- Diminution tonus oculaire
 - Perfusions ACETALOZAMIDE
 - Ponction de la chambre antérieure
- Vasodilatation / anti-oedémateux
 - Mannitol, Methylprednisolone
 - Isorbide dinitrate (RISORDAN®)
 - CARBOGEN
- Hémodilution...

Pas d'efficacité
prouvée
Vs
Placébo

Fraser SG, Adams W. Interventions for acute non-arteritic central retinal artery occlusion. Cochrane Database Syst Rev 2009

Approche Neuro-Vasculaire

Appliquée aux OACR de manière empirique depuis les années 60

5,8% des OACR bénéficient actuellement de tPA IV aux USA

Thrombolyse IV : envisageable

→ si OACR <4h30 (voir au delà ?)

... et absence de CI

- Des méta-analyses encourageantes
- Pas d'étude prospective randomisée dispo ce jour

Thrombectomie & OHB

Résultats prometteurs
Besoin de plus d'études

RECO AMA 2021

Thrombolyse IV

Pas de recommandation FR/EU en ce sens

Thrombectomie
OHB

Schorr EM, Rossi KC, Stein LK, Park BL, Tuhim S, Dhamoon MS. Characteristics and outcomes of retinal artery occlusion: nationally representative data. Stroke. 2020;51:800–807. doi: 10.1161/STROKEAHA119027034

Mac Grory B et al. American Heart Association Stroke Council; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Hypertension; and Council on Peripheral Vascular Disease. Management of Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement From the American Heart Association. Stroke. 2021

Approche Neuro-Vasculaire

étude
THEIA

«Etude multicentrique randomisée en simple aveugle, double placebo de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité de la thrombolyse par voie IV* (altéplase) dans l'occlusion aiguë de l'artère centrale de la rétine »

* dans les 4h30 suivant le début des troubles

- **18 centres**
- 70 patients recrutés entre 2018 et 2023
(35 altéplase/PCB Vs 35 aspirine/PCB)

Age moyen 70.2 ± 9 (47 - 89)
64% Hommes / 36% Femmes
Patients traités en 270min.

CDJ principal : $>0,3$ log-Mar (=15 lettres, soit 3 lignes) sur l'échelle ETDRS à M1

OACR en filière AVC

Etude THEIA

Thrombolysis in acute central retinal
Artery occlusion

OACR en filière AVC
Thrombolyse IV si $<4h30$

Attente résultats
(non concluant ?)

Approche Neuro-Vasculaire de l'OACR

AVC de l'oeil

Validation et conséquences pratiques

= Urgence

**Filière Alerte
Thrombolyse ?**

*Délais, CI ...
(cf étude THEIA)*

Explorations

- IRMc
- Angio TDMc + TSAO

+ Bilan cardio-vasculaire

Thérapeutique

- Thrombolyse IV
- Thrombectomie
- Thrombolyse in situ

Endarteriectomie

En cours d'évaluation = pas validé, pas de consensus

Chronophage = perte de chance ophtalmologique

Rationnel & intérêt de l'OHB dans l'OACR

OACR = AVC de l'Œil = Urgence thérapeutique et étiologique

Souffrance rétinienne certaine
Profondeur d'atteinte incertaine

Lésions irréversibles
dès 90 min

Absence de marqueur de
nécrose rétinienne

= **Urgence**

Pronostic fonctionnel
catastrophique

- BAV profonde constante
→ **PL / VBLM**
- Risque d'évolution vers
glaucome néovasculaire

Pas de thérapeutique efficace
Reperfusion spontanée ++

→ **25% 1^{ère} semaine**

Dans l'immense majorité < **21 j**

Acétalozamide, ponction chambre
antérieure, massages oculaires,
vasodilatateurs, hémomodilution...

Rationnel de l'OHB dans l'OACR : utiliser le **système choroïdal**

CONDITION	Accepté			Niveau d'agrément
	Niveau de preuve			
	A	B	C	
Type I				
Intoxication au CO		X		Agrément fort
Fracture ouverte avec délabrement		X		Agrément fort
Prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire		X		Agrément fort
Ostéoradionécrose (mandible)		X		Agrément fort
Radionécrose des tissus mous (cystite, proctite)		X		Agrément fort
Surdité brusque		X		Agrément fort
Accident de décompression			X	Agrément fort
Embolie gazeuse			X	Agrément fort
Infections bactériennes à anaérobies ou mixtes			X	Agrément fort
Type II				Agrément fort
Lésions de pied diabétique		X		Agrément fort
Nécrose de tête fémorale		X		Agrément fort
Greffe de peau et/ou lambeaux compromis			X	Agrément fort
Occlusion de l'artère centrale de la rétine			X	Agrément fort
Syndrome d'écrasement sans fracture			X	Agrément
Ostéoradionécrose (os autres que mandibule)			X	Agrément
Lésions radio-induites des tissus mous (autres que cystite et proctite)			X	Agrément
Chirurgie et implants en tissus irradiés (traitement préventif)			X	Agrément
Ulcères ichémiques			X	Agrément
Ostéomyélite chronique réfractaire			X	Agrément
Brûlures du 2 ^{ème} degré > 20 %			X	Agrément
Pneumatose intestinale			X	Agrément
Neuroblastome de stade IV			X	Agrément
Type III				Agrément
Cérebro-lésés (traumatisme crânien aiguë et chronique, AVC chronique, encéphalopathie post-anoxique) chez des patients hautement sélectionnés			X	Agrément
Lésions radio-induites du larynx			X	Agrément
Lésions radio-induites du SNC			X	Agrément
Syndrome d'ischémie-reperfusion après revascularisation			X	Agrément
Réimplantation de membre			X	Agrément
Plaies chroniques sélectionnées secondaires à un processus systémique			X	Agrément
Drépanocytose			X	Agrément
Cystite interstitielle			X	Agrément

Genève 17/05/2025

L'OHB dans l'OACR
= indication officielle

10ème conférence de
consensus de
médecine hyperbare
- Lille - 2016

Indication Type II

PEC hyperbare des OACR au CHU de Nice

Prise en charge en URGENCE 24/24h et 7/7j

1^{ère} séance dès que possible

2 séances/j, 7/7

Jusqu'à reperméabilisation

Tables thérapeutiques :
faible profondeur (2.2 à 2.5 ATA)
à l'Oxygène pur

Effet recherché : dissolution des gaz
→ Loi de Henry

Angiographie à J1, J15, J21 : Reperfusion ACR ?

En Pratique

Analyse sur la période Septembre 2016 – Septembre 2022

- 107 patients -
45 OACR
avec données
analysables

Acuité visuelle (AV) finale après OHB

OACR non artéritiques seules

69,8%
• Amélioration AV
(71% chez J. Desola)

30,2%

• Absence d'amélioration AV

24,5%

• Amélioration importante AV ou récupération totale

Vs

Évolution naturelle décrite : AV < 1/20^{ème} dans 70 % des cas

Écueils rencontrés sur la PEC des OACR

Retour d'expérience

Souvent banalisé

- Par le patient / soignant
- Indolore
- unilatéral
- Examen normal par ailleurs
- Patients âgés...

Coordination du parcours de soins

- Pluridisciplinaire
(ophtalmo, urgentiste, radiologue, hyperbariste, neurovasculaire)
- Communication +++
- Protocolisation +++

Méconnaissance OACR et/ou OHB

- Pas de notion d'urgence
- Pas de thérapeutique
- Indication d'OHB méconnue
- Sensibilisation soignants ++

Exemple Hier soir

Homme 71 ans

Début symptôme 07h00

Cécité œil gauche

ATCD :

HTA, DNID, dyslipidémie

Bio : absence de SIB

ECG : sinusal

Angio-TSAO : N

Examen clinique : N

Pas de déficit neuro

Pas de souffle carotidien

OACR

Accident De Plongée

ADP

Accident De Désaturation

ADD

Accidents de désaturation (**ADD**)

Tout incident au décours d'une plongée est un accident de plongée jusqu'à preuve du contraire !

= **Appel UTOH**
(24/7)
37772

Protéiforme

- 75% se déclarent dans l'heure
- Formes neurologiques précoces ++
- Intervalle libre important possible (jusqu'à 48h)
- Prise en charge souvent tardive
- Déni fréquent (plongeurs)

Déni

Rappel : classification des ADD

ADD de Type I

- Ostéo-articulaires (BEND)
- Cutanés
- Malaise

ADD de Type II

- Cérébraux
- Cochléo-vestibulaires
- Medullaires
- Pulmonaires

Régulation et PEC pré-hospitalière

en concertation avec **UTOH**

= **Appel UTOH**
(24/7)
37772

Organisation des secours

Normalement :

- 1- **CROSS MED**
(La Garde, Toulon)
- 2- SAMU maritime **83**
- 3- SAMU **06**
- 3bis- **UTOH**

Routage

- **UTOH** si suspi d'ADD

Après avis UTOH :

- **SAU** pour certains OPI,
ou barotraumatismes

Soins/TTT

- O2 15L/min au MHC
- Hydratation per os
- +/- Aspirine 250-500mg PO

Zone géographique ADP

PACA Est
De Frejus à Menton

Nb :
Nice $\approx$ 40 ADP/an
Toulon $\approx$ 200 ADP/an

Vecteur, rapidité

- Non médicalisé ++ si possible (O2 seul)
- Hélicoptère si >1h de route ou de navigation (Hélitreuilage)
 - altitude la plus basse possible (<150m)
 - **Max 300m** d'altitude (attention Estérel)
- +/- Escorte depuis Menton/Monaco
 - Basse corniche
 - Ne pas prendre l'**A8** !

ADP = urgence vraie
quelle que soit la gravité des
signes initiaux

La disparition des signes
spontanément ou sous
oxygénothérapie normobare
peut être un leurre

→ les signes d'alerte sont
décapités mais la maladie
continue d'évoluer.

**Toute symptomatologie
neurologique**

même régressive

doit être recomprimée

ADP

OPI, Chokes & Sd de fuite capillaire

Chokes

ADD pulmonaire ou *CHOKES*

De l'anglais «*to choke*» : suffoquer

A l'issue d'une plongée :

Bulles mesurées au niveau du cœur droit > 50 microns ++

Capillaires pulmonaires = 20 microns

→ Blocage puis évacuation au niveau alvéolo-capillaire

→ Système saturable

En cas de **saturation du filtre pulmonaire**
par une charge bullaire circulante trop importante

ADD pulmonaire
ou *CHOKES*

Prise en charge : sur le plan bullaire ONB sur site puis stabilisation et discuter OHB (CX18C ou L)

ADD pulmonaire ou *CHOKES*

Saturation du filtre pulmonaire

par une charge bullaire circulante trop importante

Blocage des capillaires pulmonaires

↑ Pression pulmonaire

→ Ouverture shunts intra-pulmonaires

↘ Pression pulmonaire

Shunt D/G

Risque d'ADD

↘ Hématose

Dyspnée

Activation endothéliale

→ Infiltrat lymphocytaire

Œdème interstitiel & alvéolaire

SDRA

ADD pulmonaire ou *CHOKES*

Rares mais potentiellement sévères voir fatals

Plongées saturantes, remontée rapide, non respect procédures de désaturation

Déclaration dans la première heure dans 50% des cas voir

typiquement : dans les minutes suivant la sortie de l'eau voir débutant sous l'eau

Diagnostic clinique :

- Douleur thoracique
- Tachycardie
- Dyspnée
- Crachats hémoptoïques
- +/- Douleur abdominale
- +/- Troubles de conscience
- +/- Cyanose
- +/- Cutis marmorata

Présentation type EP

- Tachypnée
- Hypoxémie
- Crépitants pulmonaires

ADD pulmonaire ou *CHOKES*

Evolution possible vers un collapsus cardio-vasculaire

- Œdème pulmonaire massif
- SDRA
- Perturbation micro-circulation pulmonaire
- Modification des rapports ventilation/perfusion
- ↗ pression artère pulmonaire et VD
- Ouverture de FOP
- Obstacle au retour veineux
- Hyperpression système veineux azygos
- Décompensation cardiaque droite
- Dilatation des cavités cardiaques droite
- Gene au remplissage cavités cardiaques gauches
- ↘ Débit cardiaque

↘ Hématose
↗ Hypoxie

Embolie paradoxale

**Stase veineuse épi/péridurale
Souffrance Médullaire**

Etat de choc Cardio-Vasculaire

Oedeme Pulmonaire d'Immersion

OPI

Conséquences cardio-pulmonaires de l'immersion

Modification significative de la physiologie pulmonaire et des échanges gazeux entre les expositions hyperbares en milieux sec & humides

Œdème pulmonaire d'Immersion

OPI

Symptomatologie pulmonaire mais origine cardiaque

Capacité cardiaques dépassées par
les contraintes liées à l'immersion :

- Bloodshift cardio-thoracique
- Augmentation du travail cardio-respiratoire

↑ retour veineux avec ↑ P° OD et DC (30%)
↓ CV 8% et ↑ effort ventilatoire

Majoré par la réponse paradoxale
à l'immersion:

- Bradycardie réflexe au froid

Conséquences de l'immersion :

- Plongée
- Apnée
- Nage en surface (triathlètes, nageurs de combat, SP...)

Peut survenir même sans pathologie cardiaque sous-jacente

Favorisé par :

- Froid
- Stress
- Effort

Principale cause de décès identifiée en plongée (autopsies M. Coulange; APHM)

Pas de recompression thérapeutique (sauf si ADD associé, rupture de palier)

SAU (ONB)

TDM

Risque de récurrence = cslt hyperbare au décours

Diagnostic :

- **Clinique**
(O2 : dyspnée résolutive)
- **TDM**
(verre dépoli péri-hilaire)

PEC : O2

- **ONB**
- **Optiflow / VNI**

*Plongeurs = déshydratés
→ éviter diurétiques*

Syndrome de fuite capillaire

Syndrome de fuite capillaire

Etiologie : Réponse systémique à l'agression bullaire (massive)

Physiopath : Activation endothéliale, $\nearrow$ perméabilité et fuite protéique

Clinique : Expression variable

D'une simple hémococoncentration

... A un tableau de choc hypovolémique avec œdèmes et $\searrow\searrow$ Albumine

Evolution péjorative possible malgré recompression thérapeutique

Prise en charge : Perfusion d'Albumine, remplissage précoce (comme grand brûlé)

Hospitalisation, risque de décompensation dans les 72h

Suivi clinico-biologique rapproché (Diurèse, Hématocrite, Albumine)

Surdités Brusques

SB

Surdités Brusques (SB)

Surdit de perception apparue en <72h, ≥ 30 dB sur 3 frquences conscutes

Etiologies : virales, vasculaires, neurinome VIII etc...

Souvent classe comme idiopathique

Inflammation / Œdme

∨ Dbit sanguin / hypoxie tissulaire

→ souffrance cochlaire

Suspi SB → ORL & Audiomtrie

Si Audio impossible → possible l'**UTOH**

➔ Appel **UTOH 37772**

Cochle = organe fragile, intolrant l'hypoxie

→ disparition du potentiel d'action cochlaire en 60 secondes en cas d'anoxie

Options thrapeutiques :

- Corticoides (*per os*, IV, ITT)
- Carbogne (O₂ + CO₂ 5-7%)
- **OHB**

Embolies Gazeuses iatrogènes

EG

Loi de Boyle & Mariotte

Pression / Volume

Loi de Henry

Dissolution des Gaz

Gradients Max O₂/N₂

Contrediffusion
↘ taille bulles

Ecraser la bulle

Diluer la bulle

Pendaisons (incomplètes)

Pendus

Rationnel : limiter les lésions cérébrales secondaires d'ischémie-reperfusion

Diminution œdème cérébral, prévention HTIC. Reprise métabolisme aérobie.

Hyperoxie → ↓ DSC et ↓ PIC (sans chute de la DO_2)
↓ du DSC → ↓ du débit d'exsudation plasmatique
↓ formation de l'œdème intersticiel

Nice : pas de pendu PEC au caisson depuis 2019

Lille : grosses cohortes, bons résultats si pas d'ACR initial (3 séances les 1ères 24h)

Etude de cohorte (n=231)

- Nouvelle étude à venir
- PHRC déposé

A 12 mois :

- Absence de séquelle neurologique: 85%
- Retour à domicile: 96%
- Reprise du travail: 77%

Crise Vaso-Occlusive (CVO) Drépanocytaire

Crise vaso-occlusive (CVO) Drépanocytaire

Indication :

CVO hyperalgique réfractaire

Malgré PEC antalgique adaptée

→ Morphiniques, S-Kétamine ...

→ >1h de PEC sans soulagement

Problématique :

Butée thérapeutique

Attente hospit Med Interne, Hémato

Souvent plusieurs heures au SAU

Effet rhéologique de l'OHB

→ Restauration déformabilité GR

→ Libération capillaires

Polymérisation Hb
en conditions
hypoxiques

Polymérisation Hb
irréversible au-delà
d'un certain délai ?

OHB

Très peu de données publiées disponibles

- Case report essentiellement

2 Etudes (au moins) en cours :

- Etude HAVOC (Nébraska, US)
- Multicentrique Franco-Helvette
- Mayotte (à venir)

Stirnemann et al. Protocol for a multicentric, double-blind, randomised controlled trial of **hyperbaric oxygen therapy** (HBOT) versus sham for treating **vaso-occlusive crisis** (VOC) in **sickle cell disease** (SCD) in patients aged 8 years or older (HBOT-SCD study). *BMJ Open*. 2024 Nov 28;14(11):e084825.

Clinicaltrial :

NCT03412045 **Completed**

Hyperbaric Oxygen Therapy in **Sickle Cell Pain**

Conditions

Sickle Cell Anemia Crisis Vaso-occlusive Crisis

Locations

Omaha, Nebraska, United States

NCT05289700 **Unknown status ***

Hyperbaric-oxygen Therapy (HBOT) Versus Placebo for Treating Vaso-occlusive Crisis (VOC) in **Sickle Cell Disease** (SCD)

Conditions

Sickle Cell Disease Hyperbaric Oxygen Therapy Vaso-occlusive Crisis

Locations

Lyon, France

Toulouse, France

Geneva, Switzerland

UTOH 2.0

P2P2

UTOH Aujourd'hui

Installation Comex actuelle, 3 chambres, Cylindriques. 3 couchés + 6 assis

12 places

2025

Caisson HAUX Quadro multichambre.

Photos en exemple : Karolinska University Stockholm (Suède)

2025

Caisson HAUX Quadro multichambre.

Photos en exemple : Karolinska University Stockholm (Suède)

UTOH 2.0 P2P2

2025

Caisson Haux
Rectangulaire - Multi chambres
« Plus grand au monde »

Capacité = **30 patients assis**
(12+12+6)

**Merci pour votre
attention !**

Des questions ?