

TRI IAO ET RÉORIENTATION POUR LES MOTIFS OPHTALMOLOGIQUES

PR BAILLIF, DR CANAC, DR PONSET

- **Œil douloureux** avec sécrétion, collé, impossibilité d'ouvrir l'œil, photophobie
- Œil douloureux chez un ENFANT
- Baisse acuité visuelle **BRUTALE** unilatérale ou non, douloureuse ou non
- Anomalie de la vision **BRUTALE** : amputation du champs visuel
- Strabisme d'apparition **BRUTALE**

ALLO OPHTALMO

- Question 1 Chirurgie des yeux/injections intraoculaire < 1 mois ?
- Question 2 Traumatisme / Corps étranger suspecté ?
(Rinçage immédiat au sérum physiologique si réception produit ménager/liquide)
- Question 3 Agression ? Nécessité de CCB ?
- Question 4 Œil douloureux + Baisse acuité visuelle ?
- Question 5 Œil douloureux + Nausées / Vomissements ?
- Question 6 Porteur de lentille de contact ?

- Œil qui gratte et qui pique
- Symptômes évoluant > 1 mois
- Deuxième avis sur conjonctivite, kératite → Traitement qui n'a pas marché
- Deuxième avis chez un patient déjà suivi par son ophtalmo sans modification des symptômes
- Œil sec
- Hémorragie sous conjonctivale : prendre TA
- Avis pour cataracte
- Avis pour glaucome chronique à angle ouvert
- Anomalie de la vision progressive sur plusieurs semaines, oeil blanc et non douloureux
- Corps flottants, mouches
- Vision normale avec douleur modérée, rougeurs, sécrétions, sensation de grains de sable
- Larmoiement
- Kyste et inflammation de la paupière

Réorientation en consultation de ville
(A Nice, RDV le jour même dispo sur doctolib)

OU

Consultation au CHU
entre 9h et 18h

JAMAIS DE PRESCRIPTION LUNETTES ET LENTILLES DE CONTACT SUR LES CONSULTATIONS DU CHU